


## PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIETEELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON KOKOUKSESTA 23.3.2005

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto sekä sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsä oli 10 jäsentä.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Puheenjohtaja esitteli uuden w-album -julkaisun, joka käsittelee Ilmajoen Kivistönmäkeä.
4. Puheenjohtaja esitteli kirjan: M.P. van Veen, Hoverflies of Northwest Europe. Identification keys to the Syrphidae. KNNV Publishing
5. Jere Kahanpää kertoi Suomessa tavattavista kiilukärpäsistä.
6. Neulatilausta ei tehdä.
7. Reijo Jussila kertoi loispistiäisistä *Phobocampe punctata* Šedivý ja *Phobocampe tempestiva* (Holmgren). Lajit ovat Suomelle uusia. (liite 1)
8. Kesäretkeä suunniteltiin Korppoon Utöseen 12.-14.8.2005.
9. Kokous päätettiin klo 20.05.



Veli-Matti Mukkala  
Hyönteiskerhon sihteeri

## Ichneumonidae: Campopleginae

Šedivý, J. 2004: European species of the genus *Phobocampe* (Hymenoptera: Ichneumonidae). – *Acta Univ. Carolinae Biol.* 48: 203-235.

*Phobocampe punctata* Šedivý, 2004

In Finland *Phobocampe punctata* has been found only from *SoL*: Salla 752:60-61 1987 [plenty of ♂♂ and ♀♀ *e.l. Epirrita autumnata* (Borkh.) (Lep.: Geometridae), K. Ruohomäki leg.]. One ♂ and one ♀ have been found from Sweden, Sappiaasi and Vittangi 1987 (*e.l. E. autumnata*, Ruohomäki leg.). This species, new to Finland, is also new to Sweden. In addition, it has been found from Poland.

*Phobocampe tempestiva* (Holmgren, 1860)

This species, new to Finland, is the most common of the Finnish *Phobocampe* species. It has been found in *Al*: Maarianhamina 668:10 (1 ♀ 25.VII.1975, R. Jussila leg.), *Ab*: Sauvo, Karuna 669:25 (4 ♂♂ and 3 ♀♀ 9-17.VII.1981 and 10-29.VII.1998, Jussila leg.) and Vahto 673-4:24 (1 ♂ and 2 ♀♀ *e.l. E. autumnata*, Ruohomäki leg.), *Ka*: Virolahti 671:53 (3 ♀♀ 20.VI-12.VII.1975, Jussila leg.), *Tb*: Saarijärvi, Pyhä-Häkki 697:42 (1 ♀ 2.VII.1981, Jussila leg.), and *Li*: Utsjoki, Kevo 774:50 (1 ♀ 2.VII.1956, Jussila leg.) and Skallavaara 774:50 (1 ♀ *e.l. E. autumnata* 1987, Ruohomäki leg.). Its distribution districts are Europe and North America.

*Phobocampe* species of Finland are now

*alticollis* (Thomson, 1887)

*bicingulata* (Gravenhorst, 1829)

*confusa* (Thomson, 1887)

*crassiuscula* (Gravenhorst, 1829)

*flavicincta* Thomson, 1887)

*luctuosa* Schmiedeknecht, 1909

*punctata* Šedivý, 2004

*tempestiva* (Holmgren, 1860)

*unicincta* (Gravenhorst, 1829)

*variabilis* Šedivý, 2004

= *neglecta* auct. misdet. nec. *Limneria neglecta* Holmgren, 1860

*Reijo Jussila*