


PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIETEELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON
KOKOUKSESTA 26.4.2006.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto ja sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsnä oli 20 jäsentä.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Veli-Matti Mukkala, Antti Haarto ja Arto Avanto kertoivat vuoden 2005 kesäretkestä Korppoon Utöseen.
4. Reijo Jussila esitteli Suomelle uudet loispistiäiset *Lissonota inareolata* Pfeffer ja *Gelanes clypeatus* (Horstmann). Molemmat lajit on saatu Korppoon Utöstä. (liite 1)
5. Suunniteltiin kesän 2006 kesäretkeä Utöseen. Ajankohta on heinäkuun viimeinen viikko.
6. Käytiin läpi palosirkkahavaintoja Varsinais-Suomesta. Sihteeri toimittaa tiedot Ympäristöministeriöön.
7. Seuraava kokous päätettiin pitää 24.5.2006 klo 18.30.
8. Kokous päätettiin klo 20.00.



Veli-Matti Mukkala
Hyönteiskerhon sihteeri

SUOMELLE UUSIA LOISPISTIÄISLAJEJA (HYM., ICHNEUMONIDAE)

Banchinae

Lissonota inareolata Pfeffer, 1913

1 ♀ *V*: Korppoo, Utö 11–14.8.2005 (R. Jussila leg.).
Saatu aikaisemmin ainoastaan Saksasta, Latviasta ja
Venäjältä.

Erotettavissa kaikista muista Suomen noin 50 lajista
etusiiven täysin puuttuvasta 3-rsm – suonesta.

Lissonotat ovat perhostoukkien koinobiontteja
parasitoideja.

Tersilochinae

Gelanes clypeatus (Horstmann, 1971)

1 ♀ *V*: Korppoo, Utö 11-14.8.2005 (R. Jussila leg.).
Saatu aikaisemmin Itävallasta, Saksasta, Tshekistä ja
Puolasta.

Erotettavissa Suomen kahdesta muusta *Gelanes*-lajista pään
genan pitkänomaisuudesta sekä kiitävän mesopleuronin
lyhyestä sternauluksesta.

Tersilochinit ovat useimmiten kovakuoriaisten (kärsäkkäät,
lehtikuoriaiset), joskus myös sahapistiäisten koinobiontteja
endoparasitoideja.

Reijo Jussila