

PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIETEELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON
KOKOUKSESTA 22.4.2015.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto ja sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsnä oli 19 jäsentä.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02
2. Sihteeri luki kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.
3. Ari Rantanen näytti Kari Kulmalan kasvattaman haapa- ja sinisilmäkiitäjän risteytyksen.
4. Veli-Matti Mukkala ja Antti Haarto kertoivat Kaarinan Järvelän hyönteisistä.
5. Suunniteltiin hyönteiskerhon kesäretkeä Finströmin Husöön elokuussa 2015.
6. Seuraava kokous päätettiin pitää 27.5.2015 klo 18.00
7. Kokous päätettiin klo 19.10.



Veli-Matti Mukkala

Hyönteiskerhon sihteeri

22.4.15

Järvelä – Kaarinan hotspot?

Veli-Matti Mukkalan tallentamasta Diptera-materiaalista määritettiin n. 1650 yksilöä 306 lajista. Tunnistetuissa lajeissa oli 3 silmällä pidettävää (NT) ja 3 Suomelle uutta laji.

Viherasekärpänen (*Oplodontha viridula* (Fabricius)) on arvioitu silmällä pidettäväksi (NT) lajiksi, joka elää lampien rannoilla ja soilla. Järvelästä havaittiin naaras 12.7.2014.

Valkonilkkaluhtiainen (*Pteromicra leucopeza* (Meigen)) on arvioitu silmällä pidettäväksi (NT) lajiksi, jonka toukka elää etanoilla varjoisien lampien rannoilla ja soilla. Lajista on tunnettu aikaisemmin Suomesta vain neljä löytöpaikkaa. Järvelän kosteikolta havaittiin kaksi koirasta 30.7.-8.9.2014.

Valevarjosäpsiäinen (*Nemopoda pectinulata* Loew) on luokiteltu silmällä pidettäväksi (NT) lajiksi, joka on Suomessa laajalle levinnyt, mutta voimakkaasti taantunut. Järvelästä havaittiin naaras 25.6.-30.7.2014.

Rapakärpäsiin (Sphaeroceridae) kuuluva *Crumomyia pedestris* (Meigen) on harvoin tavattava laji, joka normaalisti on tynkäsiipinen ja siten lentokyvytön. Lajista löytyi tynkäsiipisen naaraan lisäksi ensimmäinen Suomesta tavattu siivellinen yksilö.

Rapakärpäsiin (Sphaeroceridae) kuuluvasta lajista *Spelobia belanica* Roháček löytyi koiras 26.8.-20.9.2013. Aikaisemmin laji tunnettiin Suomesta ainoastaan Kolarista Ylläkseltä.

Tanhukärpäsiin (Empididae) kuuluva *Rhamphomyia barbata* (Macquart) on Suomelle uusi laji, josta löytyi yksi naaras kuoppapydyksestä (25.6.-30.7.2014). Laji esiintyy lähinnä läntisessä Keski-Euroopassa ja lentää siellä pääasiassa alkukesällä tuoreilla niityillä matalassa kasvillisuudessa.

Liejukärpäsiin (Ephydriidae) kuuluva *Notiphila maculata* Stenhammar on Suomelle uusi laji, josta löytyi 12 yksilöä (5.6.-1.7.2013, 3♀; 3.-25.6.2014, 2♂1♀; 25.6.-30.7.2014, 3♀; 1.7.-31.7.2014, 1♀; 30.7.-8.9.2014, 2♀). Laji tunnetaan laajalti Euroopasta sekä Suomen lähialueilta Ruotsista ja Virosta. Laji elää alavilla rannoilla lähellä vesirajaa. Pyydykset, joista yksilöt löytyivät, sijaitsivat n. puolen metrin etäisyydellä vesirajasta.

Lantasääskiin (Scatopsidae) kuuluva *Anapausis soluta* (Loew) on Suomelle uusi laji, josta löytyi yksi koiras kuoppapydyksestä (25.6.-30.7.2014). Laji on tavattu lähinnä Suomea Tanskasta, mutta lantasääskien tutkiminen on melko vähäistä monessa Euroopan maassa, joten niiden levinneisyys on puutteellisesti tunnettu. Iso-Britanniassa lajin on todettu esiintyvän monenlaisissa ympäristöissä kuten esim. kuivissa metsissä, pensaikoissa ja soilla.

Antti Haarto