

PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIEDELLISEN SEURAN HYÖNTEIS- KERHON KOKOUKSESTA 24.2.2016

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto ja sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsnä oli 22 jäsentä.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. Sihteeri luki kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.
3. Antti Haarto esitteli julkaisun: Jukka Salmela et al., Malaise-hyönteispyynti Lapin suoje-
alueilla 2012-2014. Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 221. 2015.
4. Kaj Winqvist kertoi aiheesta ”Minä, Satava ja kärpäset 2000-2015”.
5. Antti Haarto kertoi aiheesta Diptera-työryhmän Kiteen kesäretken parhaita paloja. Suomelle
uusia lajeja matkalta olivat *Eudorylas obliquus* Coe, *Sarcophaga soror* Rondani, *Coenosia
atra* Meigen ja *Tephritis separata* Rondani. (Liite)
6. Reijo Jussila esitteli Suomelle uudet ahmaspistiäiset *Diplazon angustus* Dasch ja *Diplazon
laetatorius* (Fabricius). (Liite)
7. Anssi Teräs ilmoitti Janne Jokisen toimivan tarvittaessa kuljetusapuna esimerkiksi
feromoneille.
8. Kesäretkeä suunniteltiin Kotkan Rankkiin.
9. Seuraava kokous päätettiin pitää 23.3.2016 klo 18.00.
10. Kokous päätettiin klo 20.05




Veli-Matti Mukkala

Hyönteiskerhon sihteeri

**SUOMELLE UUSIA
AHMASPISTIÄISIÄ**

**ICHNEUMONIDAE /
DIPLAZONTINAE**

TEKS 24.2.2016



214. *DIPLAZON*
laetatorius

Diplazontinae

***Diplazon angustus* Dasch, 1964**

Diplazon bachmaleri Diller, 1986

V: Nousiainen, Tepastus 6735:3237, 3.VI.2007, 1 ♂, R. Jussila leg. (S. Klopstein det.)

D. angustus muistuttaa meiltä tavatuista suvun ahmasista lähinnä lajia *D. hyperboreus* (Marshall, 1877), mutta sen kasvot ja kyljet ovat voimakkaammin pisteiset ja sillä on selvemmat keltaiset hartiatäplät (ks. tarkemmin Klopstein 2014).

Lajin on levinneisyydeltä holarkkinen. Sitä on saatu aikaisemmin Ruotsista, Venäjältä, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Ranskasta ja USA:sta (Klopstein 2014).

***Diplazon laetatorius* (Fabricius, 1781)**

Ichneumon laetatorius Fabricius, 1781

V: Turku, Kastu 671:323, 1.VII.1981, 1 ♂, R. Jussila leg.

Peru, Lima, Cieneguilia de los Chorillos 1 ♀, 5.VIII.1998, R. Jussila leg.

Tämä yksilö on ensimmäinen Suomesta ja koko Euroopasta löydetty koiras. Koiraita on tähän asti tavattu ainoastaan Pohjois-Amerikasta ja Intiasta (Klopstein 2014). Laji on sinänsä erittäin yleinen meillä Suomessa ja levinnyt etelärannikolta pohjoiseen aina Enontekiön ja Inarin Lappia myöten. Laji on kosmopoliittinen (Yu ym. 2005). Perulle tämä on uusi laji.

24.2.16

Diptera-työryhmän Kiteen kesäretken parhaita paloja

Retki järjestettiin 14.-19.7.2015. Jere Kahanpää, Iiro Kakko ja Antti Haarto lähtivät eteläisestä Suomesta kohti Kiteetä ja Jaakko Pohjoismäki liittyi tutkimusryhmään Liperissä 16.7.2015. Retken tavoitteena oli Kiteen ympäristön lajiston selvittämistä ja mahdollisesti uhanalaisten lajien havainnointia.

Menomatalla 1. pysähdys oli "Suomen parhaalla kedolla" Luumäellä (Sa: Luumäki, Päivärinne, 67551:35145), josta havaittiin uhanalaiset lajit Ketoaavekiiluri (*Sciapus albifrons*) (EN) ja Rikkikimalaiskärpänen (*Systoechus ctenopterus*) (VU). Lisäksi A. Haarto löysi paikalta naaraan Suomelle uudesta suuripääkärpäslajista, *Eudorylas obliquus* Coe, 1966.

Lappeenrannassa pysähdyttiin UPM:n teollisuuskaatopaikalle (Sa: Lappeenranta, 6776:3568) etsimään *Stratiomys longicornis* asekärpästä, joka tunnetaan Suomesta vain valokuvan perusteella. Lajia ei löydetty, mutta kylläkin samaan sukuun kuuluva silmällä pidettävä (NT) laji, Isoasekärpänen (*Stratiomys singularior*). Paikalta löytyi myös kaksi muuta uhanalaisluokituksen lajia, Viherasekärpänen (*Oplodontha viridula*) (NT) ja Loistovälkekärpänen (*Physiphora algeae*) (DD). Lisäksi A. Haarto löysi kaksi Suomelle uutta kärpäslajia, *Sarcophaga soror* Rondani, 1860 ja *Coenosia atra* Meigen, 1830.

Liperin Kuoringassa kävimme katsomassa ja kuvaamassa uhanalaista (CR) Muurahaissinisiipeä (*Glaucopsyche arion*). Useissa Liperin paikoissa tavattiin uhanalaista (VU) Rikkikimalaiskärpästä (*Systoechus ctenopterus*) ja silmällä pidettävää (NT) Kaapusurukärpästä (*Exoprosopa capucina*). Kahdelle lajille, liejukärpäselälle *Notiphila maculata* ja lantasaaskelle *Anapausis helvetica*, havaittiin Liperin Viinijärven rannasta Suomen 2. esiintymä.

Kiteeltä Savikon kartanon (68895:36660) laitumilta löydettiin mielenkiintoisia säpsiäisiä (Sepsidae), Mustajalkasäpsiäinen (*Sepsis nigripes*) (EN), Kiiltosäpsiäinen (*Sepsis thoracica*) (VU) ja Isoleukasäpsiäinen (*Saltella sphondylii*) (NT). Isoleukasäpsiäinen havaittiin myös Tohmajärveltä Kirkkoniemestä.

Tohmajärven Jalajanvaarasta (69045:36727) tavoitelimme kesämaitiaisella (*Leontodon hispidus*) elävää hedelmäkärpästä (*Tephritis mutabilis*), josta tunnettiin Suomesta (Kontiolampi 1942) vain yksi naaras aikaisemmin. Laji löytyikin kesämaitiaiskasvustosta, mutta jotta asia ei olisi ollut yksinkertainen, niin keräsin samaan purkkiin keltanokitkeröltä (*Picris hieracioides*) erittäin samankaltaista *Tephritis* lajia. Laji (*Tephritis separata* Rondani, 1871) osoittautui Suomelle uudeksi, mutta lajien erojen varmistaminen vaati asiantuntijan apua.

Turku 24.2.2016



Antti Haarto